

Allerta: NBOMe venduto come LSD!

Settembre 2015

| | |
|-----------------|---|
| Nome | Ignoto |
| Peso | 21.1 mg |
| Lung. x Larg. | 8.9 x 8 mm |
| Colore | bianco, nero, blu |
| Principi attivi | 25C-NBOMe 438.2 µg, 25B-NBOMe 691.1 µg |
| Analisi | Zurigo, Settembre 2015 |



Valutazione del rischio

Questo cartone non contiene LSD, ma 25B-NBOMe*HCl e 25C-NBOMe*HCl! Le due sostanze sono collegate a diversi decessi in Europa. Si tratta di sostanze particolarmente pericolose in quanto la loro captazione e il loro catabolismo variano notevolmente da persona a persona. Entrambe le sostanze agiscono in modo diretto e l'inizio degli effetti è rapido se assorbite attraverso le mucose. Se le sostanze sono assunte per via orale, l'effetto è invece più debole e ritardato. Si potrebbe essere quindi tentati di aumentare il dosaggio. Il consumo improprio di queste sostanze è molto pericoloso in quanto gli effetti sono molto intensi e il rischio di disturbi circolatori potenzialmente letali è elevato. In ragione della difficoltà legate alle modalità di assunzione e il potenziale di rischio, il consumo di queste sostanze è sconsigliato.

25C-NBOMe - informazioni

Informazioni generali: 25C-NBOMe*HCl appartiene alla famiglia delle fenetilamine ed è considerata una sostanza molto potente. Dosaggio: fino a 0.5 mg, dosi superiori a 0.5 mg sono considerate molto forti..

Effetti: Il 25C-NBOMe ha i tipici effetti dei trip di fenetilamine: intensificazione delle percezioni, intense sensazioni a livello gastrointestinale e forte sensibilità al tatto. Effetti visivi sono possibili, ma sono meno evidenti rispetto all'LSD. Secondo i consumatori gli effetti del 25C-NBOMe*HCl cambiano di volta in volta e non sono prevedibili anche se si mantiene il medesimo dosaggio. Il consumo non riduce l'appetito, provoca invece bocca secca, sensazioni strane in bocca (gusto) e si differenzia in modo significativo da LSD, DOI, 2C-B e 2C-I. Se assunto a livello sublinguale, gli effetti appaiono dopo circa 15-120 min. (!), per inalazione, dopo 5 -60 min. (!). Durata degli effetti: sublinguale, 6-10 ore (!), per inalazione, 4-6 ore.

Effetti collaterali: Il consumo di 25C-NBOMe provoca una costrizione vascolare periferica che dovrebbe essere trattata a livello clinico. Tra i sintomi si possono elencare dita fredde, labbra blu, intorpidimento degli arti. Senza trattamento medico, il torpore negli arti periferici può essere percepito fino ad una settimana dopo il consumo. Il consumo può inoltre provocare gonfiore alle mani, ai piedi e al viso. A causa dei rischi legati alla modalità di assunzione, bisogna evitare di assumere più dosi di 25C-NBOMe.

25B-NBOMe - informazioni

Informazioni generali: Il 25B-NBOMe*HCl fa parte della famiglia delle fenetilamine. Dose: 0.7 mg. Da 0.7 mg a 0.8 mg sono considerate molto forti.

Effetti: Il 25B-NBOMe ha i tipici effetti dei trip di fenetilamine: intensificazione delle percezioni, intense sensazioni a livello gastrointestinale e forte sensibilità al tatto. Effetti visivi sono possibili, ma sono meno evidenti rispetto

Allerta: NBOMe venduto come LSD!

Settembre 2015

all'LSD. Secondo i consumatori gli effetti del 25B-NBOMe*HCl cambiano di volta in volta e non sono prevedibili anche se si mantiene il medesimo dosaggio. Il consumo non riduce l'appetito, provoca invece bocca secca, sensazioni strane in bocca (gusto) e si differenzia in modo significativo da LSD, DOI, 2C-B e 2C-I. Se assunto a livello sublinguale, gli effetti appaiono dopo circa 15-120 min. (!), per inalazione, dopo 5 -60 min. (!). Durata degli effetti: sublinguale, 6-10 ore (!), per inalazione, 4-6 ore.

Effetti collaterali: Il consumo di 25B-NBOMe provoca una costrizione vascolare periferica che dovrebbe essere trattata a livello clinico. Tra i sintomi si possono elencare dita fredde, labbra blu, intorpidimento degli arti. Senza trattamento medico, il torpore negli arti periferici può essere percepito fino ad una settimana dopo il consumo. Il consumo può inoltre provocare gonfiore alle mani, ai piedi e al viso. A causa dei rischi legati alla modalità di assunzione, bisogna evitare di assumere più dosi di 25B-NBOMe.

Raccomandazioni di Safer Use

- Se non hai la possibilità di far analizzare le sostanze che ti appresti a consumare, inizia con ½ cartone, aspetta 2 ore per la salita degli effetti in modo da aver un miglior controllo degli effetti.
- Sapore amaro rispetto all'LSD.
- A causa delle specificità farmacocinetiche, non bisognerebbe mai assumere più dosi nella medesima occasione.
- Ricordati di bere bibite analcoliche, di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e che, prima o poi, ogni party arriva alla fine!