

Allerta: 25I-NBOMe venduto come 2C-B

Giugno 2016

Colore	bianco
Principio attivo	25I-NBOMe
Analisi	Zurigo (DIZ), Giugno 2016



Valutazione del rischio

Un campione dichiarato essere 2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenilettilamine) conteneva in realtà del 25I-NBOMe. Il 25I-NBOMe è un allucinogeno molto potente e un derivato sintetico del 2C-I. Il 25I-NBOMe può portare a un restringimento dei vasi sanguigni periferici ed è legato a certi decessi. È particolarmente preoccupante che l'assimilazione e la degradazione di questa sostanza sia molto differente secondo le persone e le occasioni di consumo. Il 25I-NBOMe ha un'azione più diretta quando si consuma per via sublinguale (sotto la lingua) attraverso le mucose. Se la sostanza si consuma per via orale, l'effetto può essere più debole e/o ritardato nel tempo. Il rischio è allora che chi consuma ne prenda una nuova dose e faccia un sovradosaggio involontario. Vista la difficoltà del dosaggio e il fatto che la sostanza sia stata appena ricercata, il consumo di 25I-NBOMe è fortemente sconsigliato! Visto che il 2C-B è efficace solo con un dosaggio molto più alto (a partire da 2-5 mg) rispetto al 25I-NBOMe (a partire da 0,05 - 0,25 mg), una dichiarazione erronea su queste sostanze può portare rapidamente ad un sovradosaggio pericoloso.

25I-NBOMe - informazioni

Informazioni generali: Il 25I-NBOMe (4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenilettilamine) fa parte del gruppo delle fenilettilamine.

Dosaggio:

via sublinguale dopo ca. 15 a 120 minuti, per via nasale dopo ca. 5 a 10 minuti. Durata degli effetti: per via sublinguale 6-10 ore, per via nasale 4-6 ore.

Effetti: Allucinazione, euforia, stimolazione mentale e fisica, coscienza modificata, sensazione corporea insolita, alterazione della percezione del tempo, confusione, nausea, insonnia, paranoia, esperienze spirituali, ipertermia, sindrome serotoninergica, restringimento dei vasi sanguigni periferici, sensazione di intorpidimento nelle mani, piedi e viso. Contrariamente all'LSD, al DOI e al 2C-B/I, il consumo di 25I-NBOMe non causa inappetenza, bocca secca o una sensazione di gusto strano.

Raccomandazioni di Safer Use

- Se non hai la possibilità di far analizzare delle sostanze, prova sempre una piccola quantità e aspetta al meno due ore fino a che tutti gli effetti si siano manifestati.
- Rifletti attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.
- Ricordati di bere bibite analcoliche (3 dl / ora), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e che, prima o poi, ogni party arriva alla fine!